

Trombosis venosa profunda

Recomendaciones al alta para pacientes



Cuando el flujo de sangre en las venas profundas se interrumpe debido a la formación de un trombo (coágulo de sangre).

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?

- El tratamiento de la trombosis venosa profunda es la anticoagulación, que reduce la capacidad de la sangre para formar coágulos.
- Con el apoyo de un equipo médico adecuado, este tratamiento se puede realizar en su domicilio de forma tan eficaz y segura como si estuviese ingresado en el Hospital.
- Inicialmente el tratamiento se administra en forma de inyecciones subcutáneas de "heparinas de bajo peso molecular" y/o anticoagulantes administrados por vía oral.
- La duración de este tratamiento es variable (habitualmente varios meses).

OBJETIVOS, BENEFICIOS Y RIESGOS DEL TRATAMIENTO


- Con este tratamiento se pretende minimizar la posibilidad de que fragmentos del trombo se desprendan y provoquen una embolia pulmonar, que incluso puede ocurrir a pesar de una correcta anticoagulación.
- También se pretende evitar la progresión de la trombosis y disminuir las secuelas por insuficiencia venosa.
- El principal riesgo del tratamiento es que se produzca una hemorragia. No obstante deben recordar que los beneficios esperados en términos de protección frente a complicaciones graves lo superan ampliamente.

Cuestiones importantes

En su caso la trombosis se ha visualizado mediante técnicas de imagen (ecografía).

Puede manifestarse con síntomas que dependen de la obstrucción al drenaje de la extremidad o complicaciones graves, incluso mortales, como consecuencia del embolismo pulmonar.

Por tanto, el cumplimiento del tratamiento resulta imprescindible.



El tratamiento más eficaz para la trombosis venosa profunda es la anticoagulación.