

**CRITERIOS DE FIBRINOLISIS** (marcar con una X lo que proceda)

CRITERIOS DE <b>INCLUSIÓN</b> FIBRINOLISIS EN EL ICTUS ISQUEMICO		
	SÍ	NO
Edad mayor de 18 años		
Diagnóstico clínico de ictus		
Rankin previo $\leq 2$		
Tiempo de evolución < 4.5h		

CRITERIOS DE <b>EXCLUSIÓN</b> FIBRINOLISIS EN EL ICTUS ISQUÉMICO		
	SÍ	NO
Hemorragia intracraneal en TAC. Sospecha de HSA aunque TAC normal. Signos de infarto extenso		
Crisis epiléptica al comienzo del ictus		
Resolución o rápida mejoría de los síntomas		
Déficit neurológico ligero (NIHSS<3) o extenso (NIHSS>25)		
Glucemia <50 mg/dl ó >400 mg/dl		
Plaquetas < 100.000/mm <sup>3</sup>		
HTA grave no controlada		
Tratamiento con acenocumarol (si INR>1.7) o en las últimas 12 horas con nuevos anticoagulantes orales o HBPM (a dosis anticoagulantes)		
Cirugía mayor o traumatismo grave en las últimas 2 semanas		
Hemorragia grave manifiesta o en los últimos 21 días		
Sospecha o historia conocida de hemorragia cerebral, HSA o después de hemorragia por aneurisma		
Cualquier historia de lesión del Sistema Nervioso Central (neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal)		
Ictus (excepto AIT) o TCE grave en los últimos 3 meses		
Ictus isquémico previo y diabetes mellitus		
Aneurismas arteriales, malformaciones arteriales/venosas		
Punción de vaso sanguíneo no compresible (yugular o subclavia) en los últimos 10 días		
Punción lumbar en los últimos 7 días		
Neoplasia con riesgo de hemorragia aumentado		
Retinopatía hemorrágica		
Masaje cardíaco externo traumático en los últimos 10 días		
Infarto de miocardio en las últimas 4 semanas		
Endocarditis bacteriana. Pericarditis. Pancreatitis aguda		
Biopsia hepática o pulmonar en los últimos 14 días		
Enfermedad hepática grave: insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, varices esofágicas, hepatitis activa		
Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos tres meses		
Embarazo. Parto obstétrico en el último mes		

**ESCALA DE RANKIN MODIFICADA**

0	Sin síntomas	
1	Sin incapacidad importante	Capaz de realizar sus actividades habituales
2	Incapacidad leve	Incapaz de realizar algunas de sus actividades previas, pero capaz de velar por sus intereses y asuntos <b>sin ayuda</b>
3	Incapacidad moderada	Síntomas que restringen significativamente su estilo de vida e impiden su subsistencia totalmente autónoma ( <b>alguna ayuda</b> )
4	Incapacidad moderadamente severa	Síntomas que impiden claramente su subsistencia independiente aunque sin necesidad de atención continua
5	Incapacidad severa	Totalmente dependiente, necesitando asistencia constante día y noche
6	Muerte	

## ESCALA NIHSS

		1ª	Pre rt-PA	1h	Posteriores		
		Fecha:	Horas:				
<b>Nivel consciencia (NC)</b>	<b>0</b>	Alerta. Respuestas normales					
	<b>1</b>	No alerta pero responde a mínimos estímulos verbales para obedecer o responder					
	<b>2</b>	No alerta. Requiere estímulos repetidos o dolorosos para realizar movimientos					
	<b>3</b>	Sólo respuestas reflejas o falta de respuestas					
<b>Preguntas orales (NC)</b> - Edad y mes - Si no puede emitir sonidos y no afásico: "1" - Si afasia o estupor: "2"	<b>0</b>	2 correctas					
	<b>1</b>	1 correcta					
	<b>2</b>	Ninguna correcta					
<b>Órdenes motoras (NC)</b> - Cerrar ojos. Abrir ojos - Cerrar y abrir mano	<b>0</b>	2 correctas					
	<b>1</b>	1 correcta					
	<b>2</b>	Ninguna correcta					
<b>Mirada conjugada</b> - Si paresia periférica nervio oculomotor: "1"	<b>0</b>	Normal					
	<b>1</b>	Paresia parcial					
	<b>2</b>	Paresia total o desviación forzada					
<b>Visual</b> - Si ceguera bilateral: "3" - Si sólo extinción visual: "1"	<b>0</b>	Normal					
	<b>1</b>	Hemianopsia parcial					
	<b>2</b>	Hemianopsia completa					
	<b>3</b>	Ceguera total					
<b>Paresia facial</b>	<b>0</b>	Normal					
	<b>1</b>	Borramiento surco nasogeniano o mínima asimetría al sonreír					
	<b>2</b>	Parálisis total o casi total de la zona inferior de la hemicara					
	<b>3</b>	Parálisis completa (superior e inferior)					
<b>Brazo</b> - Separadamente, a 45° - No valorar mano - No puntuar si amputación proximal o inmovilización	<b>0</b>	Mantiene posición 10 segundos					
	<b>1</b>	Claudicación <10 seg pero no contacta cama	<b>D</b>				
	<b>2</b>	Levanta pero contacta con cama en <10 seg					
	<b>3</b>	Existe movimiento pero no levanta contra gravedad o cae inmediatamente	<b>I</b>				
	<b>4</b>	Ausencia total de movimiento					
<b>Pierna</b> - Separadamente, a 30° - No puntuar si amputación proximal o inmovilización	<b>0</b>	Mantiene posición 5 segundos					
	<b>1</b>	Claudicación <5 seg pero no contacta cama	<b>D</b>				
	<b>2</b>	Levanta pero contacta con cama en <5 seg					
	<b>3</b>	Existe movimiento pero no levanta contra gravedad o cae inmediatamente	<b>I</b>				
	<b>4</b>	Ausencia total de movimiento					
<b>Dismetría</b> - Si déficit motor impide valoración: "0"	<b>0</b>	Ausente					
	<b>1</b>	Presente en 1 extremidad					
	<b>2</b>	Presente en 2 extremidades					
<b>Sensibilidad</b> - Si bilateral o coma: "2" - No valorar manos-pies	<b>0</b>	Normal					
	<b>1</b>	Hipoestesia leve-moderada: nota que se le toca					
	<b>2</b>	Anestesia severa-total: no nota que se le toca					
<b>Lenguaje</b> - Palabras y dibujos (p.5) - Si coma: "3" - Si mudo o intubación hacer escribir	<b>0</b>	Normal					
	<b>1</b>	Afasia leve o moderada					
	<b>2</b>	Afasia severa (imposible entenderse)					
	<b>3</b>	Mudo con comprensión nula					
<b>Disartria</b> - Si afasia=3 (mudo), disartria "0"	<b>0</b>	Normal					
	<b>1</b>	Leve o moderada (puede ser entendido)					
	<b>2</b>	Severa, ininteligible o mudo/anártrico					
<b>Inatención. Extinción. Negligencia.</b> - Corporal y Espacial - Visual y Táctil (ya exploradas) - Si coma: "2"	<b>0</b>	Sin alteraciones					
	<b>1</b>	Inatención o Extinción en 1 modalidad					
	<b>2</b>	Negligencia severa o Extinción en más de una modalidad. No reconoce su propia mano o sólo una parte del espacio.					
		<b>TOTAL</b>					