

La vacunació enfront de COVID-19 amb vacunes de ARNm (Moderna-Spikevax® o Pfizer-Comirnaty®) requereix de dues injeccions (en alguns casos pot estar indicada una dosi addicional o de record) administrades de manera intramuscular en la part superior del braç.

Amb Pfizer-Comirnaty®, entre l'administració de la 1a i la 2a dosi hauran de passar, com a mínim, 3 setmanes. Amb Moderna-Spikevax®, entre la primera i la segona dosi hauran de passar aproximadament 4 setmanes.

S'administrarà una dosi de record, quan estiga indicada, a les persones vacunades amb ARNm a partir de 6 mesos d'haver completat la pauta de vacunació enfront de COVID-19 i, als qui van rebre Janssen o AstraZeneca-Vaxzevria®, almenys 3 mesos després de la seua administració.

Beneficis de la vacunació

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment a totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Reaccions adverses o efectes secundaris

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o esgarrifances i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant els 15 minuts següents a la vacunació, observe si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Què fer en cas d'una reacció adversa o efecte secundari

Si després de vacuna apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com a paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal d'atenció primària, especialment si presenta dificultat en respirar, palpitations o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web <https://www.notificaram.es/> o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat d'enllaços d'interés.

Informe de vacunació

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP (<http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio>)

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE pot obtindre'l en el següent enllaç:

<http://coronavirus.san.gva.es/es/certificado-digital-ue>

QÜESTIONARI	MESURES A ADOPTAR
Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes, a algun dels seus components (incloent polietilenglicol i polisorbato)?	Contraindicació absoluta
Ha passat la COVID-19, amb o sense símptomes, en les últimes 4 setmanes?	Vacunar a partir de les 4 setmanes des del diagnòstic. Les persones majors de 65 anys, o pertanyents al grup 4 o 7, o residents en centres residencials, precisaran per a la primovacunació la pauta completa, la resta només una dosi. Si està en aquesta situació, comente-ho amb els professionals sanitaris per a la seua valoració
Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C?	Posposar la vacunació
Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?	Observar 30 min després de la vacunació
Ha rebut alguna vacuna recentment?	No és necessari separar la vacuna enfront de COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies
Pateix immunosupressió?	Vacunar igualment. La resposta immune pot ser inferior
Està rebent tractaments enfront de COVID19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?	Posposar la vacunació 90 dies
Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?	Precisa valoració: Si INR descontrolat, posposar la vacunació. Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.
Quina edat té?	Edat mínima de vacunació: 12 anys (menors de 16 requereixen autorització) La dosi de record es recomana a les persones de 40 o més anys, a les vacunades amb Janssen o AstraZeneca de qualsevol edat i als grups prioritzats en l'estratègia.