TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE SÍFILIS LATENTE

Algoritmo departamental

Carmen Sáez Barberá
Médico Adjunta de Medicina Interna.
Sección infecciosas - Grupo PROA

2

Introducción

- Infección sistémica
- *Treponema pallidum*. Bacteria Gram negativa.
- Contagio via sexual: infectividad 30%
- **Clasificación según tiempo desde la infección:**

Tratamiento

Latente precoz

< 1 año

- Cambio en las serologías en el **último año**:
 - Negativo a positivo
 - Aumento de 2 diluciones en pacientes con antecedente de sífilis
- Adquisición tras contacto reciente (< 1 año) con pareja sexual diagnosticada de sífilis precoz.

Latente tardía

RESTO
Incluida indeterminada

PENICILINA G BENZATINA 2.400.000UI IM

DOSIS ÚNICA

1 dosis
semanal
3 semanas

Si alergia a penicilina

Doxiciclina 100 mg cada 12 h

14 días

21 días

Seguimiento

Latente precoz

Latente tardia

Serologia

VIH -

6 meses
12 meses

VIH +

3 meses
6 meses
12 meses
24 meses

VIH -

6 meses
12 meses
24 meses

Bajada de 2 diluciones

Bajada de 2 diluciones

Si al finalizar el tratamiento:

➔ No hay disminución de al menos 2 diluciones de RPR

PUNCIÓN LUMBAR Descartar neurosífilis asintomática